

SUR UN *ACIDANTHERA* (IRIDACÉE) DE GUINÉE

par H. JACQUES-FÉLIX

Laboratoire de Phanérogamie
Muséum - PARIS

RÉSUMÉ : *Dortania amoena* A. Chev. (1937) est en réalité un *Acidanthera* pour lequel une combinaison nouvelle est proposée : *A. amoena* (A. Chev.) Jac.-Fél.

SUMMARY: *Dortania amoena* A. Chev. (1937) is actually an *Acidanthera*; a new combination is therefore proposed : *A. amoena* (A. Chev.) Jac.-Fél.

Le genre africain *Acidanthera*, surtout diversifié depuis l'Éthiopie, d'où il a été décrit, jusqu'en Afrique du Sud en passant par les chaînes d'Afrique orientale, est peu représenté en Afrique occidentale.

La deuxième édition de la Flora of West Tropical Africa, 3, 1, ne fait état que de deux espèces :

1° *A. æquinoctialis* (Herb.) Back., bien connue des pics rocheux de Sierra Léone, Guinée et Côte d'Ivoire, d'une part, et aussi des montagnes sud-ouest du Cameroun, d'autre part. Encore doit-on ajouter, selon F. N. HERPPER, qu'elle est peu distincte de *A. bicolor* Hochst., sur laquelle est basé le genre, bien que décrite postérieurement.

2° *A. divina* Vaupel, espèce très voisine de la précédente, localisée à Fernando Po, aux montagnes occidentales du Cameroun et, peut-être aussi, au pic du Vokré dans le nord.

Enfin, sur une récolte que nous avons faite sur le plateau du Benna en Guinée, A. CHEVALIER a décrit en 1937 une Iridacée qu'il a placée dans le genre *Dortania* créé à cet effet. Malheureusement cette publication a échappé à l'attention du rédacteur de cette famille et il n'en est pas fait mention dans l'ouvrage sus-indiqué.

Cela nous amène à reconsidérer cette récolte et il nous apparaît qu'il s'agit d'un *Acidanthera* spécifiquement valable pour lequel nous proposons le binôme suivant :

***Acidanthera amoena* (A. Chev.) Jac.-Fél., comb. nov.**

— *Dortania amoena* A. CHEV., Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. 2, 9 : 402 (1937).

Bien que cette plante soit typiquement uniflore, caractère invoqué entre autres par A. CHEVALIER pour créer un genre nouveau, elle se



Aspidistra amara (L.) Sw. Pol.

Détaché de *Aspidistra* Sw. 1857

1955 - Beauv. 2000 m. 6-27.

filices de montagne

à Rouleau

à 1 1 1 1

TYPE

Herb. Mus. Paris

no 4900

Aspidistra amara L.

1 m.

1857

rapporte indiscutablement au genre *Acidanthera* par ses étamines à anthères cuspidés, ses graines ailées, le tube de la corolle, etc.

Elle se distingue fort aisément de *A. equinoctialis* (Herb.) Bak. par ses fleurs plus petites, concolores, à tépales lancéolés au lieu d'ovales. Elle se rapproche davantage de *A. gracilis* Pax, mais elle s'en distingue aussi par les fleurs à limbe plus petit et la forme des tépales. Les feuilles de base peuvent atteindre 45 cm de longueur.



Acidanthera equinoctialis (Herb.) Bak., Mont Tonkoui, Côte d'Ivoire
(Photo F. HALLÉ).